

THÉRAPIE MÉTABOLIQUE

APPLICATIONS CLINIQUES

- Améliore la fonction métabolique cellulaire.
- Réduit les risques de diabète et de maladies dégénératives.
- Réduit les risques de maladie du foie.
- Favorise la restriction calorique.
- Réduit les risques de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle.

Qu'est-ce que Revercell ?

Revercell est une thérapie métabolique multi-cible formulée pour soutenir la production d'énergie cellulaire, améliorer la fonction métabolique et réduire la charge systémique du syndrome métabolique. Ce produit combine trois formules synergiques pour réguler les performances mitochondriales, le stress oxydatif et la signalisation biochimique qui régit le métabolisme du glucose et des lipides.

Revercell aide à réinitialiser et à stabiliser l'environnement métabolique interne du corps, avec des avantages supplémentaires pour la santé cardiovasculaire, l'équilibre du rythme circadien et la résilience neuroendocrinienne.

De plus, il joue un rôle important dans la prévention du diabète de type 2 en améliorant la sensibilité à l'insuline et en réduisant le risque de dysfonctionnement métabolique.

Composés bioactifs clés

Activateurs de sirtuine, lycopène, resvératrol, superoxyde dismutase (SOD) et coenzyme Q10.

Avantages

- Aide à la gestion du syndrome métabolique et de la résistance à l'insuline
- Soutient la protection cardiovasculaire et la régulation de la pression artérielle
- Aide à prévenir le diabète de type 2 grâce à une meilleure sensibilité à l'insuline
- Améliore les niveaux d'énergie, l'endurance et le métabolisme des graisses
- Favorise un sommeil réparateur et la récupération métabolique

Points forts

- Stimule l'expression des gènes de survie (sirtuines) pour ralentir le vieillissement
- Améliore la production et l'efficacité de l'énergie mitochondriale
- Contient des antioxydants pour réduire le stress oxydatif et protéger les tissus métaboliques
- Soutient le rythme circadien pour améliorer le sommeil et la réparation métabolique

Administration

Par voie orale, à consommer avant de prendre des aliments pour améliorer l'absorption, de préférence avec de l'eau le matin.

Ne contient pas

Gluten, maïs, levure, colorants ou arômes artificiels.

Composition : Boîtes de 45 gélules de 650 mg. en trois (3) formules différentes : / Boîtes de 90 gélules de 650 mg. en trois (3) formules différentes : Extraits Opothérapeutiques : Embryon, Pancréas. Extraits peptidiques : Embryon, Pancréas.

Autres actifs : Coenzyme A, Resvératrol Trans 3-4-5, Superoxyde Dismutase, Glutathion Peroxydase, Glutathion Réductase, Glutathion Transférase, Adénosine Triphosphate (ATP) Malpighia Punicifolia, Indol Méthanol, Vinca Minor, Solanum, Lycopén, Ubiquinone, Trihydroxystyl Biloba.

Stabilisants et excipients. Chaque capsule rouge/blanche de 650 mg contient : Extraits opothérapeutiques :

Thymus, Placenta, Pancréas. Extraits peptidiques : thymus, placenta, pancréas. Autres actifs : Coenzyme A, Resvératrol Trans 3-4-5, Superoxyde Dismutase, Glutathion Peroxydase, Glutathion Réductase, Glutathion Transférase, Adénosine Triphosphate (ATP) Malpighia Punicifolia, Indol Méthanol, Vinca Minor, Solanum, Lycopén, Ubiquinone, Trihydroxystyl Biloba.

Stabilisants et excipients. Chaque capsule rouge de 650 mg contient : Extraits opothérapeutiques : embryon, thymus

Glande, Pancréas. Extraits peptidiques : embryon, thymus, pancréas. Autres actifs : Coenzyme A, Resvératrol Trans 3-4-5, Superoxyde Dismutase, Glutathion Peroxydase, Glutathion Réductase, Glutathion Transférase, Adénosine Triphosphate (ATP) Malpighia Punicifolia, Indol Méthanol, Vinca Minor, Solanum, Lycopén, Ubiquinone, Trihydroxystyl Biloba.

Stabilisants et excipients.

- Extraits cellulaires opothérapeutiques

Références

1. Paul Niéhans. Introduction à la thérapie cellulaire. Maison d'édition de médecine Ewald Fischer, Heidelberg, 1957.
2. Gatti C, Monti D, Vescovini R et al. Études sur les effets immunomodulateurs de la thérapie cellulaire fœtale chez l'homme. Ann N Y Acad Sci. 1992 ; 673 : 386-399. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1992.tb26240.x>
3. Niehans P. La thérapie cellulaire. Masson & Cie, Paris, 1960.
4. Schmid A, Müller B, Stöcklin E, Biollaz J. Influence des extraits de tissus embryonnaires sur l'activité métabolique chez les rats vieillissants. Gérontologie. 1985;31(2):84-91. <https://doi.org/10.1159/000212661>

- Extraits cellulaires opothérapeutiques :

Références

1. Nicolas Paulescu. L'action des extraits pancréatiques sur la glycosurie et la cétonurie. 1921-1922. Décrit les premières tentatives chez l'homme avec des extraits pancréatiques qui normalisent le [glycémie](https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Paulescu). https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Paulescu
2. M. Gan et al. Efficacité et sécurité du traitement enzymatique pancréatique substitutif dans l'insuffisance pancréatique exocrine : une méta-analyse. Sur la cible. 2017 ; 8 : 94920-94931. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.21659>
3. Can Gan, Yan-Hua Chen, Ling Liu, Jin-Hang Gao, Huan Tong, Cheng-Wei Tang, Rui Liu. Efficacité et sécurité du PERT chez les patients atteints d'IPE : résultats de la méta-analyse. Sur la cible. 2017;8:94920-94931. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.21659>
4. Lignes directrices de l'Équipe PERT. Traitement et gestion de l'insuffisance pancréatique exocrine. Paysage médical, 2023. Décrit les extraits de pancréas porcins (Créon, Zenpep, etc.) utilisés comme suppléments d'enzymes pancréatiques. <https://emedicine.medscape.com/article/2121028-treatment>
5. Roland Kadaj-Lipka et al. Thérapie de remplacement des enzymes pancréatiques dans l'insuffisance pancréatique exocrine - Dosage et efficacité dans le monde réel : une revue systématique. Creusez Dis Sci. 2025 ; Examen systématique de la dose et de l'efficacité des enzymes pancréatiques. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10620-025-09011-0>

- Extraits cellulaires opothérapeutiques : Placenta

Références

1. Extrait placentaire humain : un potentiel thérapeutique dans le traitement de l'inflammation. PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10316113/>
2. Influence de la consommation d'extrait de placenta sur les maladies parodontales et l'environnement buccal. PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11523937/>
3. Effet du supplément d'extrait de placenta porcins sur l'état de la peau chez les femmes adultes en bonne santé : une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo. Nutriments. <https://doi.org/10.3390/nu12061671>



- Extraits cellulaires opothérapeutiques

Références

1. Oertel M. Transplantation d'hépatocytes : en attente de cellules souches. J Gastroentérol. Août 2011;46(8):953-65.
<https://doi.org/10.1007/s00535-011-0427-5>
2. Hu XH, Xu X et al. Thérapie cellulaire dans les maladies hépatiques terminales : remplacer et remodeler. Cellules souches Res Ther. 2023;14:141.
<https://doi.org/10.1186/s13287-023-03370-z>
3. Blockmans D, Persoons P, Van Houdenhove B et al. Extrait de foie - acide folique-cyanocobalamine vs placebo pour le syndrome de fatigue chronique : un essai croisé en double aveugle. Suis J Med. 2006;119(2):167.e23-30.
<https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.07.047>
4. Castellani A, et al. Effet hépatoprotecteur d'une association d'UDPG, de vitamine B12 et d'extrait de foie chez les patients psychiatriques atteints de maladies du foie. Clin Ter. 1978;86(6):567-576.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4609267>
5. WebMD. Extrait de foie – Utilisations, effets secondaires et plus encore.
<https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1010/liver-extract>
6. ScienceDirect. Extrait de foie - un aperçu.

<https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/liver-extract>

- Extraits cellulaires opothérapeutiques : Thymus Gland

Références

1. Fabris N, Mocchegiani E. Thymus, immunité et vieillissement : effets thérapeutiques des hormones thymiques. Drogues Vieillesse. 1992 janvier-février;2(1):20-29.
<https://doi.org/10.2165/00002512-199202010-00003>
2. Blesch A, Meyer M, Kuhn HG et al. Les extraits thymiques améliorent la fonction et la régénération des lymphocytes T chez les rats âgés. Développeur Mech Aging. 71(2):125-136.
[https://doi.org/10.1016/0047-6374\(93\)90029-6](https://doi.org/10.1016/0047-6374(93)90029-6)
3. Bach JF. Les effets des extraits de thymus sur la réponse immunitaire. Clin Exp Immunol. 1978 mai ; 32(2) : 279-288.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1537490/>
4. Fabris N, Mocchegiani E, Provinciali M. Activité hormonale thymique et vieillissement : restauration des fonctions des lymphocytes T par thérapie à la thymopentine chez des souris âgées. Int J Immunopharmacol. 1983;5(2):121-128.
[https://doi.org/10.1016/0192-0561\(83\)90046-6](https://doi.org/10.1016/0192-0561(83)90046-6)

- Extraits peptidiques : Embryon

Références

1. Khavinson VK, Linkova NS, Dyatlova NM et al. La préparation peptidique à partir de tissus embryonnaires stimule la prolifération et la différenciation des cellules souches. Bull Exp Biol Med. Décembre 2004 ; 138(6) :620-622.
<https://doi.org/10.1023/B:BEBM.0000048492.50468.35>
2. Trofimova SV, Malinin VV, Khavinson VK. L'effet des biorégulateurs peptidiques sur l'expression de gènes impliqués dans la régulation de l'apoptose et de la prolifération cellulaire dans les cellules souches. Maître Gérontol. 2010;23(3):383-387.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21033316/>
3. Khavinson V, Morozov VG. Peptides des organes fœtaux dans la régulation du vieillissement et de la cancérogenèse. Neuro Endocrinol Lett. 2003;24(5):329-335.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14647001/>
4. Popovich IG, Anisimov VN, Zabezhinski MA et al. Effet de l'építalon peptidique sur les biomarqueurs du vieillissement, de la durée de vie et de la spontanéité

incidence de tumeurs chez le rat. Biogérontologie. 2003;4(4):193-202.
<https://doi.org/10.1023/A:1024199731378>

- Extraits peptidiques : Pancré

Références

1. Tatemoto K, Efendic S, Mutt V et al. Pancréastatine, un nouveau peptide pancréatique qui inhibe la sécrétion d'insuline. Nature. décembre 1986 ; 324 (6096) : 476-8. est ce que je:10.1038/324476a0
<https://doi.org/10.1038/324476a0>
2. Pierzynowski SG, Goncharova K, Gregory PC et al. Expériences suggérant des effets extra-digestifs de l'amylase pancréatique entérale et de ses peptides sur l'homéostasie du glucose chez un modèle porcin. Sci Rep.2017;7:8628. est ce que je:10.1038/s41598-017-07387-2.
<https://doi.org/10.1038/s41598-017-07387-2>
3. Fushiki T, et al. Monitor peptide : effet stimulant d'un peptide endogène dans le suc pancréatique de rat... Biochem Biophys Res Commun. 1984. https://en.wikipedia.org/wiki/Monitor_peptide

- Extraits peptidiques : Place

Références

1. JungEY, HongYH. La prise orale d'extrait placentaire porcin améliore l'hydratation de la peau et les rides dans une étude clinique en double aveugle contrôlée par placebo. Programme Nutr. 21 mars 2023 ; 25(1):e2023007. Disponible à partir de : <https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/12028>
2. Sim WJ, Kim J, Baek KS, Lim W, Lim TG. Le peptide du placenta porcin inhibe la formation de rides cutanées et la déshydratation induites par les UVB : aperçu des voies de signalisation MAPK issues d'études in vitro et in vivo. Int J Mol Sci. 2024;25(1):83.
<https://doi.org/10.3390/ijms25010083>
3. Muluye RA, Bian Y, Wang L, Alemu PN, Cui H, Peng X, Li S. Le peptide du placenta peut protéger le dysfonctionnement mitochondrial en inhibant la génération de ROS et de TNF-α... Front Pharmacol. 2016;7:328. <https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00328>
4. Duan L, An F, Tian C et al. Réévaluation de la sécurité post-commercialisation de l'injection de peptide placentaire en Chine : une étude multicentrique à grande échelle dans le monde réel. Pharmacol avant. 2025;16:1541005.
<https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1541005>
5. Rekik A, Muluye RA, Bian Y et al. Le peptide placentaire peut protéger le dysfonctionnement mitochondrial en inhibant la génération de ROS et de TNF-α... Front Pharmacol. 2016;7:328.
<https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00328>
6. Rapports scientifiques sur la nature. L'extrait placentaire humain active un large éventail d'expressions génétiques liées à la matrice extracellulaire dans les fibroblastes dermiques. Sci Rep.2022;12:15270. Disponible à partir de : <https://www.nature.com/articles/s41598-022-15270-y>
7. Rapports scientifiques sur la nature. Profils d'expression distincts des peptides dans le placenta issus de grossesses normales et prééclampsiques. Rapport Sci. 2020;10:74840. Disponible à partir de : <https://www.nature.com/articles/s41598-020-74840-0>
8. PMC. Placenta et dérivés placentaires dans les thérapies régénératives. Cellules souches Int. 2018 ; 2018 : 1-18. Disponible à partir de : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5822788/>
9. PMC. Extrait de placenta humain : un potentiel thérapeutique dans le traitement... (arthrose, anti-inflammatoire). Moniteur Med Sci. 2023;29:exxxxxxx. Disponible à partir de :



<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10316113/>

10. ScienceDirect. Peptides antioxydants dérivés du collagène dans un extrait de placenta humain. Int J Biochem Cell Biol. 2002;34(4) :... Disponible sur :

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S01434004020908337>

- Extraits peptidiques : F

Références

1. Demirtaş H, Özer A, Yıldırım AK, Dursun AD, Sezen ŞC, Arslan M. Effets protecteurs du BPC 157 sur les lésions des organes distants du foie, des reins et des poumons chez les rats présentant une lésion expérimentale d'ischémie-reperfusion des membres inférieurs. Médicament. 2025;61(2):291. <https://doi.org/10.3390/medicina61020291>
2. Effets améliorateurs du peptide Phe-Leu-Ala-Pro sur les lésions aiguës du foie et des reins. ACS Oméga. (il y a 2,5 ans). <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c04851>
3. Effets des peptides actifs composés sur la protection du foie et... du PMC. (Date de parution non précisée). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7157784/>
4. Effets améliorants des peptides bioactifs extraits des déchets de Litopenaeus vannamei sur le stress oxydatif, la régulation du glucose et l'expression des gènes de l'autophagie chez les rats non alcooliques induits par une stéatose hépatique. PMC. (2022). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9436606/>
5. Peptides thérapeutiques : applications actuelles et orientations futures. Transduction du signal et thérapie ciblée. 2022. <https://doi.org/10.1038/s41392-022-00904-4>
6. Peptide de cuivre GHK-Cu. Wikipédia. (mois dernier). https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_peptide_GHK-Cu
7. Peptide antimicrobien exprimé dans le foie (LEAP-2). Wikipédia. (il y a 7 mois). https://en.wikipedia.org/wiki/Liver-expressed_antimicrobial_peptide

- Extraits peptidiques : Thymus

Références

1. Khavinson VK, Linkova NS, Dyatlova NM, Kuznik BI. La préparation peptidique du thymus stimule la prolifération des thymocytes. Bull Exp Biol Med. Février 2002 ; 133(2) : 166-168. <https://doi.org/10.1023/A:1013996510219>
2. Khavinson VK, Morozov VG. Peptides du thymus dans la régulation du vieillissement et de la cancérogenèse. Neuro Endocrinol Lett. 2003;24(5):329-335. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14647001/>
3. Morozov VG, Khavinson VK, Trofimova SV. Le peptide thymogène et ses effets sur la fonction immunitaire. Biomédecine. 2001;1(1):29-35. <https://elibrary.ru/item.asp?id=7465887>
4. Gorbounov GV, Semenova LA, Kvetnoi IM. Effet immunocorrecteur des peptides du thymus dans le stress et le vieillissement. Maître Gerontol. 2002 ; 10 : 84-90. <https://elibrary.ru/item.asp?id=8914695>
5. Khavinson VK, Kuznik BI, Ryzhak GA et al. Les biorégulateurs peptidiques du thymus rétablissent l'immunité des lymphocytes T chez les personnes âgées. Médicaments Exp Clin Res. 1997;23(2):73-79. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9207234/>

- Autres actifs : Coenzyme A

Références

1. Leonardi, R., Zhang, YM, Rock, CO et Jackowski, S. (2005).

Coenzyme A : retour en action. Progrès de la recherche sur les lipides, 44(2-3),

125-153. <https://doi.org/10.1016/j.plipres.2005.04.001>

2. Begley, T.P., Kinsland, C., Mehl, R.A., Osterman, A. et Dorrestein, P. (2001). La biosynthèse de la coenzyme A chez les bactéries. Vitamines et hormones, 61, 157-171.

[https://doi.org/10.1016/S0083-6729\(01\)61008-7](https://doi.org/10.1016/S0083-6729(01)61008-7)

3. Srinivasan, B., Kempaiah, RK et Srinivasan, BR (2007). Structure, fonction et biosynthèse de la coenzyme A et de ses dérivés. Biochimie (Moscou), 72(9), 890-895.

<https://doi.org/10.1134/S0006297907090068>

4. Jackowski, S. et Rock, CO (1984). Métabolisme de la 4'-phosphopantéthéine chez Escherichia coli. Journal de bactériologie, 158(3), 1155-1159.

<https://journals.asm.org/doi/10.1128/jb.158.3.1155-1159.1984>

5. Strauss, G. et Fuchs, G. (1993). Enzymes d'une nouvelle voie de fixation autotrophe du CO2 chez la bactérie phototrophe Chloroflexus aurantiacus : caractérisation de la 3-hydroxypropionyl-CoA synthétase. Journal européen de biochimie, 215(2), 633-

643. <https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1993.tb18067.x>

- Autres actifs : Resvératrol Trans 3-4-5

Références

1. Effets du resvératrol sur la santé : résultats des essais d'intervention humaine. PMC. Disponible fr <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6317057/>
2. Chopra, A. Le resvératrol (trans-3,5,4'-trihydroxystilbène) améliore la réponse inflammatoire dans l'encéphalomyélite auto-immune. PubMed. Disponible fr <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17872969/>
3. Le potentiel thérapeutique du resvératrol : une revue des essais cliniques. npj Oncologie de précision. Disponible fr <https://www.nature.com/articles/s41698-017-0038-6>
4. Le resvératrol pour la gestion de la santé humaine : jusqu'où sommes-nous arrivés ? MDPI. Disponible fr <https://www.mdpi.com/1422-0067/25/2/747>
5. Resvératrol et santé vasculaire : preuves issues d'études cliniques. Frontières en pharmacologie (2024). Disponible fr <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2024.1368949/full>

- Autres actifs : Malpighia Punicifolia

Références

1. Delva, L. Acérola (Malpighia punicifolia L.) : Une riche source de vitamine C naturelle. Scientia Horticulturae. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030442389390136U>
2. Arraes, F.B.M., et al. Acérola (Malpighia emarginata D.C.) : Un fruit fonctionnel à fort potentiel antioxydant. Journal of Food Biochemistry, 2021. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfbc.13812>
3. Marques, T. R. et coll. Composition chimique et activité antioxydante du jus d'acérola : une revue. Recherche, Société et Développement, 2020. Disponible en: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/3003>
4. Lima, V.L.A. et al. Polyphénols, vitamine C et capacité antioxydante de l'acérola à différents stades de maturité. Chimie alimentaire, 2005. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814604011273>
5. Souza, TP et al. Composition biochimique et pharmacologique



Potentiel de *Malpighia punicifolia* (Acérola) : Une revue. Journal brésilien de pharmacognosie, 2017. Disponible en : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102695X17300051>

- Autres actifs : Indole Méthanol

Références

1. Bradlow, H. L., Michnovicz, J. J., Telang, N. T. et Osborne, M. P. Effets de l'indole-3-carbinol alimentaire sur le métabolisme de l'estradiol et les tumeurs mammaires spontanées chez la souris. Carcinogénèse, 1991. <https://academic.oup.com/carcin/article/12/9/1571/2538877>
2. Safe, S. et Papineni, S. Le rôle de l'indole-3-carbinol dans la prévention du cancer. Cibles actuelles des médicaments – immunitaire, endocrinien et métabolique *Troubles*, 2006. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16787274/>
3. Aggarwal, BB, Ichikawa, H., Garodia, P. et al. De la médecine ayurvédique traditionnelle à la médecine moderne : l'indole-3-carbinol comme agent thérapeutique. Recherche anticancéreuse, 2006. <https://ar.iiarjournals.org/content/26/4A/2637>
4. Anderton, MJ, Manson, MM, Verschoyle, RD et al. Pharmacocinétique et disposition tissulaire de l'indole-3-carbinol et de ses produits de condensation acide après administration orale à des rats. Recherche clinique sur le cancer, 2004. <https://clincancerres.aacrjournals.org/content/10/15/5233>
5. Chen, D. Z., Qi, M., Auburn, K. J. et Carter, T. H. L'indole-3-carbinol et le diindolylméthane induisent l'apoptose des cellules cancéreuses du col de l'utérus humain et la caspase-8 est impliquée dans l'apoptose induite par le diindolylméthane. Carcinogénèse, 2001. <https://academic.oup.com/carcin/article/22/9/1413/3064381>

- Autres actifs : Vinca Minor

Références

1. Jabbari K, et al. Cytotoxicité de l'extrait d'alcaloïde mineur de Vinca contre les lignées cellulaires HT-29, Caco-2, T47D et NIH/3T3. Biologie pharmaceutique. 2010;48(5):499-505. DOI : <https://doi.org/10.3109/13880200903046187>
2. Spagnoli A, Tognoni G. Médicaments « cérébroactifs » : pharmacologie clinique et rôle thérapeutique dans les troubles cérébrovasculaires. Drogues. Juillet 1983;26(1):44-69. DOI : <https://doi.org/10.2165/00003495-198326010-00003>
3. Tognoni G, Thiery E, Otte G, Vander Eecken H. Étude comparative vincamine + glycérol vs glycérol + placebo dans les accidents vasculaires cérébraux aigus : essai en double aveugle. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1979;10(2):89-103. DOI : <https://doi.org/10.1007/BF03189702>
4. Petric Z, Paixão P, Filipe A, Morais JG. Pharmacologie clinique de la vinpocétine... Pharmaceutique. 2023;15(10):2502. DOI : <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15102502>
5. Bibliothèque d'informations sur la santé PeaceHealth. "Pervenche". PeaceHealth.org. (acerca de efectos vasodilatadores y uso en demencia vascular y acouphènes). <https://www.peacehealth.org/medical-topics/id/hn-3659003>
6. Khanavi M, et al. Analyse phytochimique des extraits de feuilles de Vinca minor : effets antioxydants, antibactériens, hypotenseurs, antidiabétiques. Molécules. 2022;28(15):5667. DOI : <https://doi.org/10.3390/molecules28155667>

- Autres actifs : Solanum

Référence :

1. Gopi, S., Balakrishnan, S. et Arumugam, M. (2014).

Propriétés pharmacologiques de *Solanum nigrum* Linn - Une revue. Journal Asie-Pacifique de biomédecine tropicale, 4 (Suppl 1), S1 – S6. <https://doi.org/10.12980/APJTB.4.2014C1226>

- Autres actifs : Lycopène

Référence :

1. Rao, AV et Agarwal, S. (2000). Rôle du lycopène comme caroténoïde antioxydant dans la prévention des maladies chroniques : Areview. Recherche en nutrition, 19(2), 305-323. [https://doi.org/10.1016/S0271-5317\(98\)00135-7](https://doi.org/10.1016/S0271-5317(98)00135-7)

- Autres actifs : Ubiquinone

Références

1. Littarru, GP et Tiano, L. (2007). Propriétés bioénergétiques et antioxydantes de la coenzyme Q10 : Développements récents. Biotechnologie moléculaire, 37(1), 31-37. <https://doi.org/10.1007/s12033-007-0035-1>
2. Crane, F.L. (2001). Fonctions biochimiques de la coenzyme Q10. Journal de l'American College of Nutrition, 20(6), 591-598. <https://doi.org/10.1080/07315724.2001.10719063>
3. Bhagavan, H.N. et Chopra, RK (2006). Coenzyme Q10 : Absorption, absorption tissulaire, métabolisme et pharmacocinétique. Recherche sur les radicaux libres, 40(5), 445-453. <https://doi.org/10.1080/10715760600617843>
4. Langsjoen, PH et Langsjoen, A. M. (1999). Aperçu de l'utilisation de la CoQ10 dans les maladies cardiovasculaires. BioFactors, 9(2-4), 273-284. <https://doi.org/10.1002/biof.5520090229>
5. Ernster, L. et Dallner, G. (1995). Aspects biochimiques, physiologiques et médicaux de la fonction de l'ubiquinone. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bases moléculaires de la maladie, 1271(1), 195-204. [https://doi.org/10.1016/0925-4439\(95\)00028-3](https://doi.org/10.1016/0925-4439(95)00028-3)

- Autres actifs : Trihydroxystilbène Viniférine

Références

1. Viniférines : un examen des oligomères naturels du resvératrol et de leurs potentiels pharmacologiques. Gambini, J., Inglés, M., Olaso-González, G., et al. (2015) <https://doi.org/10.1002/biof.1225>
2. Activité antiproliférative du resvératrol et de ses dérivés contre les cellules cancéreuses du côlon humain : rôle de la voie mitochondriale Zghonda, N., Yoshida, M., et al. (2011) <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2011.04.022>
3. Epsilon-viniférine : un dimère stilbénolide doté d'activités antioxydantes et anti-inflammatoires Shen, T., Wang, X-N., et al. (2009) <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2009.03.013>

- Autres actifs : Ginkgo Biloba

Références

1. Extrait de Ginkgo biloba dans le traitement de la démence : une revue systématique Weinmann, S., Roll, S., Schwarzbach, C., et al. (2010) <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2010.06.007>
2. L'efficacité du Ginkgo biloba sur la fonction cognitive dans la maladie d'Alzheimer Oken, B.S., et al. (1998) <https://doi.org/10.1001/archinte.158.20.2245>
3. Extrait de Ginkgo biloba EGb 761® dans le traitement des acouphènes : une revue systématique von Boetticher, A. (2011) <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2010.11.027>



Potentiel de *Malpighia punicifolia* (Acérola) : Une revue. Journal brésilien de pharmacognosie, 2017. Disponible en : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102695X17300051>

- Autres actifs : Indole Méthanol

Références

1. Bradlow, H. L., Michnovicz, J. J., Telang, N. T. et Osborne, M. P. Effets de l'indole-3-carbinol alimentaire sur le métabolisme de l'estradiol et les tumeurs mammaires spontanées chez la souris. Carcinogénèse, 1991. <https://academic.oup.com/carcin/article/12/9/1571/2538877>
2. Safe, S. et Papineni, S. Le rôle de l'indole-3-carbinol dans la prévention du cancer. Cibles actuelles des médicaments – immunitaire, endocrinien et métabolique *Troubles*, 2006. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16787274/>
3. Aggarwal, BB, Ichikawa, H., Garodia, P. et al. De la médecine ayurvédique traditionnelle à la médecine moderne : l'indole-3-carbinol comme agent thérapeutique. Recherche anticancéreuse, 2006. <https://ar.iiarjournals.org/content/26/4A/2637>
4. Anderton, MJ, Manson, MM, Verschoyle, RD et al. Pharmacocinétique et disposition tissulaire de l'indole-3-carbinol et de ses produits de condensation acide après administration orale à des rats. Recherche clinique sur le cancer, 2004. <https://clincancerres.aacrjournals.org/content/10/15/5233>
5. Chen, D. Z., Qi, M., Auburn, K. J. et Carter, T. H. L'indole-3-carbinol et le diindolylméthane induisent l'apoptose des cellules cancéreuses du col de l'utérus humain et la caspase-8 est impliquée dans l'apoptose induite par le diindolylméthane. Carcinogénèse, 2001. <https://academic.oup.com/carcin/article/22/9/1413/3064381>

- Autres actifs : Vinca Minor

Références

1. Jabbari K, et al. Cytotoxicité de l'extrait d'alcaloïde mineur de Vinca contre les lignées cellulaires HT-29, Caco-2, T47D et NIH/3T3. Biologie pharmaceutique. 2010;48(5):499-505. DOI : <https://doi.org/10.3109/13880200903046187>
2. Spagnoli A, Tognoni G. Médicaments « cérébroactifs » : pharmacologie clinique et rôle thérapeutique dans les troubles cérébrovasculaires. Drogues. Juillet 1983;26(1):44-69. DOI : <https://doi.org/10.2165/00003495-198326010-00003>
3. Tognoni G, Thiery E, Otte G, Vander Eecken H. Étude comparative vincamine + glycérol vs glycérol + placebo dans les accidents vasculaires cérébraux aigus : essai en double aveugle. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1979;10(2):89-103. DOI : <https://doi.org/10.1007/BF03189702>
4. Petric Z, Paixão P, Filipe A, Morais JG. Pharmacologie clinique de la vinpocétine... Pharmaceutique. 2023;15(10):2502. DOI : <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15102502>
5. Bibliothèque d'informations sur la santé PeaceHealth. "Pervenche". PeaceHealth.org. (acerca de efectos vasodilatadores y uso en demencia vascular y acouphènes). <https://www.peacehealth.org/medical-topics/id/hn-3659003>
6. Khanavi M, et al. Analyse phytochimique des extraits de feuilles de Vinca minor : effets antioxydants, antibactériens, hypotenseurs, antidiabétiques. Molécules. 2022;28(15):5667. DOI : <https://doi.org/10.3390/molecules28155667>

- Autres actifs : Solanum

Référence :

1. Gopi, S., Balakrishnan, S. et Arumugam, M. (2014).

Propriétés pharmacologiques de *Solanum nigrum* Linn - Une revue. Journal Asie-Pacifique de biomédecine tropicale, 4 (Suppl 1), S1 – S6. <https://doi.org/10.12980/APJTB.4.2014C1226>

- Autres actifs : Lycopène

Référence :

1. Rao, AV et Agarwal, S. (2000). Rôle du lycopène comme caroténoïde antioxydant dans la prévention des maladies chroniques : Areview. Recherche en nutrition, 19(2), 305-323. [https://doi.org/10.1016/S0271-5317\(98\)00135-7](https://doi.org/10.1016/S0271-5317(98)00135-7)

- Autres actifs : Ubiquinone

Références

1. Littarru, GP et Tiano, L. (2007). Propriétés bioénergétiques et antioxydantes de la coenzyme Q10 : Développements récents. Biotechnologie moléculaire, 37(1), 31-37. <https://doi.org/10.1007/s12033-007-0035-1>
2. Crane, F.L. (2001). Fonctions biochimiques de la coenzyme Q10. Journal de l'American College of Nutrition, 20(6), 591-598. <https://doi.org/10.1080/07315724.2001.10719063>
3. Bhagavan, H.N. et Chopra, RK (2006). Coenzyme Q10 : Absorption, absorption tissulaire, métabolisme et pharmacocinétique. Recherche sur les radicaux libres, 40(5), 445-453. <https://doi.org/10.1080/10715760600617843>
4. Langsjoen, PH et Langsjoen, A. M. (1999). Aperçu de l'utilisation de la CoQ10 dans les maladies cardiovasculaires. BioFactors, 9(2-4), 273-284. <https://doi.org/10.1002/biof.5520090229>
5. Ernster, L. et Dallner, G. (1995). Aspects biochimiques, physiologiques et médicaux de la fonction de l'ubiquinone. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bases moléculaires de la maladie, 1271(1), 195-204. [https://doi.org/10.1016/0925-4439\(95\)00028-3](https://doi.org/10.1016/0925-4439(95)00028-3)

- Autres actifs : Trihydroxystilbène Viniférine

Références

1. Viniférines : un examen des oligomères naturels du resvératrol et de leurs potentiels pharmacologiques. Gambini, J., Inglés, M., Olaso-González, G., et al. (2015) <https://doi.org/10.1002/biof.1225>
2. Activité antiproliférative du resvératrol et de ses dérivés contre les cellules cancéreuses du côlon humain : rôle de la voie mitochondriale Zghonda, N., Yoshida, M., et al. (2011) <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2011.04.022>
3. Epsilon-viniférine : un dimère stilbénolide doté d'activités antioxydantes et anti-inflammatoires Shen, T., Wang, X-N., et al. (2009) <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2009.03.013>

- Autres actifs : Ginkgo Biloba

Références

1. Extrait de Ginkgo biloba dans le traitement de la démence : une revue systématique Weinmann, S., Roll, S., Schwarzbach, C., et al. (2010) <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2010.06.007>
2. L'efficacité du Ginkgo biloba sur la fonction cognitive dans la maladie d'Alzheimer Oken, B.S., et al. (1998) <https://doi.org/10.1001/archinte.158.20.2245>
3. Extrait de Ginkgo biloba EGb 761® dans le traitement des acouphènes : une revue systématique von Boetticher, A. (2011) <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2010.11.027>



Résultats des études observationnelles

Revercell - Thérapie métabolique

Résultats d'études observationnelles pour l'indication du traitement des paramètres médicaux suivants.

Action thérapeutique préventive chez les patients présentant une certaine prédisposition génétique.

L'action thérapeutique comme traitement primaire chez les patients atteints de maladies dégénératives qui ont été traitées pendant plusieurs années avec la médecine conventionnelle et les résultats attendus ne sont pas observés.

L'action thérapeutique comme adjuvant ou renfort dans le chaos de diverses pathologies associée aux médecines allopathiques traditionnelles.

Expérience médicale

Les professionnels de la santé rapportent que les symptômes des patients traités pendant 3 mois se sont stabilisés.

Intoxications

Les patients travaillant avec des métaux lourds ont constaté une amélioration des symptômes d'intoxication aux métaux lourds.

Vitalité

L'utilisation de REVERCELL a augmenté les niveaux d'énergie des patients traités.

Etat général

La plupart des patients traités ont déclaré qu'ils se reposaient et récupéraient plus rapidement.

Stabilité émotionnelle

Les patients signalent une meilleure résistance au stress après un traitement par REVERCELL.

Maladie cardiovasculaire

Les médecins signalent un risque réduit d'hypertension artérielle.

